

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Радуга
города Стерлитамак"
Г.Х. Фатхутдинова
« » 2020 г.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО (ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО) НА ЗАБОЛЕВАНИЕ КАРАНТИННЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

1. Врач, заподозривший заболевание на карантинную инфекцию, не выходит из помещения (палаты или кабинета), где находится больной (подозрительный).

2. По телефону или с нарочным, сотрудником ЛПУ, не бывшим в контакте с больным сообщает о поставленном диагнозе заведующему отделением, при его отсутствии лицу, его замещающему.

3. В помещении, где выявлен больной (подозрительный) закрывают плотно двери и окна, заклеивают форточки и вентиляционные отверстия.

4. До получения защитной одежды при подозрении на чуму, геморрагические вирусные лихорадки, оспу, временно закрывает нос и рот полотенцем или маской, сделанной из подручного материала (вата, марля, бинт)

5. Выясняет подробно: анамнез; эпидемиологический анамнез с учётом инкубационного периода (чума - 6 дней, холера - 5 дней, лихорадка Ласа, Марбурга, Эбола - 21 день, птичий грипп - 7 дней, ТОРС - 10 дней); уточняет, где находился и с кем был в контакте больной (подозрительный) в течение этого времени; подробно описывает объективный статус, оценивает тяжесть состояния больного и выставляет предварительный диагноз.

6. Запрашивает:

а) защитную одежду (в зависимости от диагноза: при холере - халат, колпак, маску, перчатки; при чуме, геморрагических вирусных лихорадках, оспе, птичьим гриппе, атипичной пневмонии - противочумный костюм 1 тип).

б) бакукладку для забора материала от больного для лабораторных исследований,

в) дезсредства и емкости для проведения текущей дезинфекции помещения и выделений больного.

г) необходимые медикаменты для оказания помощи больному и для проведения личной профилактики.

Вызывает на себя врача консультанта (врач - инфекционист).

При получении средств индивидуальной защиты, дезсредств, медикаментов - врач принимает меры личной профилактики:

- одевает защитный костюм, не снимая собственной одежды

- перед одеванием защитной одежды открытые части тела обрабатывает раствором дезинфицирующего средства или 70% раствором этилового спирта, а слизистые оболочки - раствором стрептомицина (при чуме) или слабым розовым раствором марганцовки при геморрагических вирусных лихорадках и оспе, птичьим гриппе, атипичной пневмонии.

7. Дождаться прихода инфекциониста или врача другой специальности и покинуть кабинет.

8. После работы снимает защитный костюм в специально выделенном помещении, или в этой палате, после проведения текущей дезинфекции.

При наличии в помещении, где находится больной (подозрительный) раковиной и унитазом пользоваться категорически запрещено.

Заведующий педиатрическим отделением



Г. В. Маркина