

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга
города Стерлитамак»
 Г. Х. Фатхутдинова
«__» 2020 г.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО (ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО) НА ЗАБОЛЕВАНИЕ КАРАНТИННЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ.

1. Средний медработник, заподозривший заболевание на карантинную инфекцию, не выходит из помещения (палаты или кабинета), где находится больной (подозреваемый).

2. По телефону или с нарочным, сотрудником ЛПУ, не бывшим в контакте с больным (подозреваемым) сообщает о подозрении на карантинное заболевание лечащему врачу, заведующему отделением, при его отсутствии лицу его замещающему.

3. Вызывает врача консультанта (врач-педиатр врач - инфекционист) на себя в палате.

- где выявлен больной чумой холеры. КВГЛ плотно закрывает двери и окна, заклеивает форточки и вентиляционные отверстия.

4. Запрашивает:

а) защитную одежду;

- до получения защитной одежды при подозрении на чуму, геморрагические вирусные лихорадки, оспу, временно закрывает нос и рот полотенцем или маской, сделанной из подручного материала (вата, бинт, марля);

- одевает защитный костюм, не снимая собственной одежды, но перед одеванием открытые части тела обрабатывает раствором дезинфицирующего средства или 70 % спиртом, а слизистые оболочки - раствором стрептомицина (при чуме) или слабым розовым раствором марганцовки при геморрагических вирусных лихорадках и оспе, птичьим гриппе, атипичной пневмонии.

б) бакукладку для забора материала от больного для лабораторных исследований.

в) дезсредства и емкости для проведения текущей дезинфекции помещения и выделений больного.

г) медикаменты для личной профилактики.

5. При подозрении на холеру строго соблюдает меры личной профилактики желудочно-кишечных инфекций:

- после осмотра больного руки следует обработать раствором дезинфицирующего средства или кожным антисептиком;

- при попадании выделения больного на одежду (спец. одежду или личную),

обувь следует заменить на запасную, а всю загрязнённую одежду оставить для обеззараживания.

6. Обеспечивает забор материала от больного для лабораторного исследования согласно инструкции до начала специфического лечения.

7. Проводит текущую дезинфекцию, при необходимости привлекая к работе младший медицинский персонал (обеззараживает выделения больного, смывные воды после мытья рук, предметы ухода за больным и т.д.).

8. Дождаться прихода инфекциониста или врача-педиатра и покинуть кабинет.

После работы снимает защитный костюм в специально выделенном помещении, или в этой палате, после проведения текущей дезинфекции

Важно! При наличии в помещении, где находится больной (подозрительный) раковиной и унитазом пользоваться категорически запрещено.

Заведующий педиатрическим отделением



Г. В. Маркина